

۱) کدام یک از موارد زیر بیشترین اهمیت را در کاهش احتمال انتقال دارد؟

1. استفاده از تهویه مناسب

2. استفاده از دستکش

3. استفاده از مواد ضد عفونی کننده

4. استفاده از شیلد

۲) کدامیک از رضایت های زیر باید قبل از جراحی اخذ شود؟

1. رضایت انجام عمل

2. رضایت عوارض

3. رضایت انتقال کووید

4. همه موارد بالا

۳) در شرایط کووید، کدام یک از وسایل زیر در حین جراحی الزامی به استفاده ندارد؟

1. ماسک جراحی

2. عینک

3. دستکش ضد ویروس

4. کلاه جراحی

۴) در صورت مثبت شدن PCR بیمار در اسکرینینگ قبل از عمل، قدم بعدی چیست؟

1. میتوان عمل را انجام داد

2. عمل کنسل و به تعویق انداخته شود

3. بیمار به مرکز دیگری برای درمان منتقل می شود

4. همه موارد فوق براساس پروتوکول منطقه ای صحیح است.

۵) جهت اسکرینینگ بیمار قبل از جراحی، کدام روش زیر صحیح است؟

1. PCR

2. Antibody

3. Chest CT

4. همه موارد بالا

۶) در شرایط حفظ منابع، از ماسک N95 در اتاق عمل تا چه مدت می توان استفاده کرد؟

1. هر یکساعت تعویض شود.

2. بعد از هر عمل تعویض شود.

3. در انتهای روز عمل دور انداخته شود.

4. تا یک هفته در اتاق عمل استفاده شود.

5.

۷) برای معاینه بیمار با علایم تنفسی، کدام یک از وسایل حفاظت شخصی الزامی میشود؟

a. ماسک طبی، گان، دستکش و محافظ چشم یا صورت

b. ماسک طبی، گان و دستکش

c. حتما باید coverall استفاده شود.

d. در معاینه بیمار سرپایی با توجه به زمان اندک تماس میتوان فقط به ماسک و دستکش اکتفا نمود.

۸. در طبقه بندی بیماران برای اعمال جراحی، کدام گروه از بیماران از نظر کووید ۱۹- پرخطر ارزیابی میشوند؟

e. بیماران علامت دار

f. بیماران با PCR مثبت

g. بیماران با علائم درگیری ریوی در CT SCAN

h. همه موارد فوق

۹. برای بیماران سرپایی ارتوپدی کدام مورد صحیح نمیشود؟

i. مراجعه ی سرپایی برای بیماران با علائم تنفسی یا احتمال ابتلا به بیماری کووید به درمانگاه ارتوپدی ممنوع است.

j. ورود همراهان، بستگان و مراقبین بیمار به مراکز سرپایی ممنوع میباشد.

k. وقت های ویزیت بیماران در صورت بروز علائم کووید ۱۹-، کنسل و به زمان دیگری بعد از بهبودی کامل انتقال یابد.

l. بهتر است جهت اطمینان از عدم ابتلا به کووید، تعداد و مدت زمان ویزیت بیماران را نسبت به

شرایط عادی افزایش داد.

۱۰. در بیماران بستری در دوران پاندمی کدام توصیه را نمی پسندید؟

m. هدف کاهش تعداد بستری و کوتاه کردن زمان بستری است

n. تکنیکهای کم تهاجمی بر روشهای دیگر ارجحیت دارند.

o. کاهش تعداد ملاقات ها برای بیماران بستری فاقد علائم کووید ۱۹- ضروری نمیشود.

p. بخش های بستری بیماران علامت دار یا مثبت از نظر کووید ۱۹- باید از سایرین جدا باشد.

۱۱. در مورد احتیاطات حول وحوش جراحی در زمان پاندمی کووید ۱۹- کدام توصیه صحیح تر است؟

q. انجام بیهوشی جنرال بر بیهوشی موضعی ارجح است.

r. بعد از جراحی در بیمار با کووید بهتر است برای جلوگیری از الودگی بیشتر اتاق عمل بیمار در اولین فرصت از ریکاوری به

بخش منتقل شود.

s. بعد از جراحی در بیمار با کووید و قبل از ورود بیمار بعدی بهتر است اتاق با اشعه ماورای بنفش یا

بخور اب اکسیژنه ضد عفونی شود.

t. غربالگری بیمار الکتیو از نظر کرونا بهتر است درست بلافاصله قبل از جراحی و بعد از بستری شدن بیمار انجام شود.

۱۲. در مورد اقدامات جراحی در زمان پاندمی کووید ۱۹- کدام مورد صحیح تر است؟

u. انجام توتال هیپ ارتروپلاستی نسبت به همی ارتروپلاستی در درمان شکستگی جابجاشده گردن استخوان ران در

افراد مسن ارجح است.

v. شکستگی کوندیل خارجی هومروس کودکان بهتر است به صورت کنزرواتیو وبا فالوپ مکرر و نزدیک انجام شود.

w. در رفتگی مفاصل بزرگ (پروستتیک یا طبیعی) بهتر است در اتاق عمل اورژانس جاناندازی و در صورت

پایدار بودن بیمار مرخص گردد.

X. در بیماران نیازمند اعمال جراحی اورژانس، بررسی از نظر کووید واخذ رضایت آگاهانه در مورد خطر افزایش یافته ابتلا به کووید و عوارض آن ضروری نمیباشد.

۱۳- در مورد بیمار مبتلا به کووید-۱۹ که نیاز به عمل جراحی اورژانس داشته باشد کدام مورد زیر اشتباه است؟
الف- عمل جراحی باید با حضور حداقل پرسنل انجام شود.

ب- برای تهویه اتاق روشن بودن کولر کفایت می کند.

ج- استفاده از لوازم حفاظت فردی برای پرسنل الزامی است.
د- در حین اینداکشن بیهوشی حضور حداقل پرسنل جایز است.

۱۴- لوازم حفاظت فردی مورد نیاز پرسنل در حین عمل جراحی اورژانس در بیماری که از نظر کووید ۱۹ بررسی نشده است کدامیک از موارد زیر نیست؟

الف- گان سرتاسری غیر قابل نفوذ

ب- شیلد یا عینک محافظ

ج- ماسک FFP2 در مواردی که انتشار aerosolized particles محتمل است

د- دولایه دستکش نیتریل

۱۵- در مورد استفاده از الکتروکوتر در حین عمل جراحی بیمار مبتلا به کووید ۱۹ کدامیک صحیح نیست؟

الف- استفاده از الکتروکوتر در اعمال ارتوپدی منعی ندارد

ب- استفاده از الکتروکوتر باید محدود یا منع شود

ج- امکان انتقال پارتیکلهای ویروس در دود حاصل از الکتروکوتر وجود دارد

د- تهویه مناسب دود حاصل از الکتروکوتر در حین عمل الزامی است.

۱۶- برای جلوگیری از شکایات پزشکی لازم است:

الف - پروتکل های اعلام شده را رعایت نمایم

ب- اندیکاسیون قطعی اعمال جراحی طبق رفرانس های علمی گذاشته شود.

ج- الف و ب

د- هیچکدام

۱۷- کدامیک در خصوص ضرورت اخذ رضایت آگاهانه در خصوص بیماری کووید ۱۹ صحیح می باشد؟

الف- نیازی به اخذ رضایت نمی باشد

ب- اخذ رضایت از همراه کافی است

ج- اخذ رضایت از بیمار ضروری است

د- هیچکدام

۱۸- در هنگام بروز عارضه کدامیک صحیح می باشد؟

الف- در هنگام بروز عارضه لازم است پزشک معالج با بیمار صحبت نموده و توضیحات کامل در خصوص عارضه و راههای درمان ارائه نماید و پی گیری های لازم جهت درمان انجام دهد.

- ب- در هنگام بروز عارضه نیازی به پی گیری پزشک معالج نیست
- ج- درخواست مشاوره کفایت و نیازی به صحبت با بیمار نمی باشد
- د- هیچکدام

۱۹. در پرونده بیمار پره آپ ارتوپدی بی علامت از نظر کووید که تست های آزمایشگاهی اسکرینینگ هم منفی بوده اند، کدام یک بهتر است ثبت شود؟

الف. در حال حاضر نشانه ای از ابتلا به کووید در بیمار دیده نمیشود.

- ب. بیمار از نظر کووید منفی می باشد.
- ج. در حال حاضر، بیمار به کووید مبتلا نمی باشد.
- د. فقط در موارد کووید مثبت، ذکر آن در پرونده الزامی است.

۲۰. مضرات انجام جراحی الکتیو طی دوره پیک اپیدمی کدام است؟

- الف. در صورت ابتلای بیمار به کووید در طی دوره پری آپرتیو، احتمال مرگ بیمار جراحی شده دهها برابر بیمار معمولی است.
- ب. احتمال ابتلا برای پزشک و پرسنل درمان افزایش می یابد.
- ج. چرخه فاصله گذاری اجتماعی بعلت ورود بیمار، همراهان و پرسنل درمان، دچار وقفه میشود.

د. همه موارد